

Герпесвирусная инфекция кошек

Герпесвирусная инфекция кошек (инфекционный ринотрахеит) – острая респираторная вирусная инфекция, характеризующаяся поражением слизистых конъюнктивы, дыхательных путей и половой сферы.

Первые упоминания об этой болезни кошек появились в 60-х годах прошлого века (Кринделл, Маурер, 1960).

На сегодняшний день эта болезнь встречается практически во всех странах мира среди домашних и диких кошек. Кроме того, ею болеют леопарды, тигры, гепарды, иногда собаки.

Особенностью болезни является тот факт, что переболевшие герпесвирусной инфекцией кошки остаются пожизненными носителями возбудителя инфекции.

Основными клиническими признаками болезни являются при неосложненной форме слезотечение, выделения катарального (слизистого), а затем гнойного экссудата из глаз. Позже появляется сопящее дыхание и из носа тоже появляются выделения. Нередко обнаруживается кератит (бельмо) на роговице глаза, на носу иногда тоже формируются язвы. Беременные кошки abortируют или у них появляется маложизнеспособное потомство. В ротовой полости развивается стоматит и гингивит.

Особенностью болезни следует считать то, что кошки длительное время могут будучи зараженными, не проявлять признаков болезни. Нередко эти симптомы появляются после выставок, операций, переохлаждений, родов, появления в питомнике новых животных.

Заражение может произойти воздушно-капельным путем, через корм и воду, контаминированные возбудителем, половым. Трансплацентарно вирус может быть передан от матери к потомству.

Лечение таких больных обычно не представляет больших трудностей. Однако следует помнить о том, что, во-первых, по классическому проявлению болезнь очень похожа на хламидиоз, микоплазмоз, иммунодефицит. Наконец, аллергические конъюнктивиты и риниты могут проявляться аналогичным образом. Тактика лечебных мероприятий при этих болезнях различна. Поэтому, перед тем, как начинать лечить, лучше проконсультироваться у ветеринарного врача.