

Внимание пироплазмоз!!!

Пироплазмоз (бабезиоз) собак – это паразитарная болезнь, вызываемая паразитированием в эритроцитах крови простейших (бабезий).

В последние годы данное заболевание приобретает массовый характер. При этом необходимо отметить, что зачастую животное погибает из-за несвоевременного обращения владельцев к ветеринарным специалистам.

Итак, рассмотрим возбудителя данного заболевания и пути инфицирования животного. Возбудителем болезни является *Babesia canis* реже *B. gibson*, который локализуется в эритроците, а также в плазме крови. При микроскопическом исследовании мазков крови, сделанных от больных животных, обнаруживаются бабезии грушевидной, амёбовидной, овальной формы.

Переносчиками возбудителя болезни являются иксодовые клещи (*Rhipicephalus*, *Dermacentor*).

Клещи начинают нападать на животных в период наступления относительно теплой погоды и появления первой растительности. Пик заболеваемости собак пироплазмозом приходится на весенний период. В летний зной активность клещей снижается, однако, нежарким летом количество случаев заболеваемости может оставаться на прежнем уровне. Осеннее течение бабезиоза характеризуется меньшим количеством заболевших животных, однако болезнь протекает тяжелее и выздоровление наступает медленнее и часто регистрируется летальный исход, несмотря на своевременное обращение владельцев к ветеринарным специалистам.

Инкубационный период бабезиоза составляет 6-10 дней. Болезнь может протекать как в острой (3-7 сут.) так и в хронической (3 мес.) форме.

Первыми симптомами болезни являются общая слабость (животное отказывается от корма), резкое повышение температуры тела до 40-42 °С. Под действием бабезий эритроциты крови разрушаются, что приводит к

поражению печени и почек. Клинически это проявляется желтушностью слизистых и кожи, окрашиванием мочи в бурый цвет.

Бабезии и продукты их жизнедеятельности вызывают серьезные нарушения функций различных органов и систем: поражение печени, поджелудочной железы, дистрофия почек, миокардит и тд. При этом данные изменения могут оставаться на всю жизнь. Иммунодефицитные состояния, возникающие при бабезиозе, обуславливают восприимчивость организма собаки к бактериальным и вирусным инфекциям.

В связи с этим, при появлении первых признаков болезни необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу, так как именно ветеринарный специалист способен дифференцировать данную болезнь от инфекционного гепатита и лептоспироза, имеющих сходные клинические признаки.

Лечение больных бабезиозом собак осуществляется ветеринарными специалистами Саратовского областного кинологического клуба, находящегося по адресу ул. Мичурина д.22, пересечение улиц Мичурина и Рахова.

Помимо этого, в данной организации проводят профилактическую вакцинацию животных против бабезиоза.